

**Caecum clarkii** Carpenter, 1858, in Zeeuwsch-Vlaanderen

R. H. DE BRUYNE

Bilderdijkkade 91, 1053 VL Amsterdam

In ruim 3 liter schelpengruis, verzameld op 9 en 10 juni 1983 aan de monding van het Zwin bij Cadzand, trof ik een gaaf exemplaar aan van *Caecum clarkii* Carpenter, 1858 (zie Van Aartsen & Fehr-de Wal, 1975). Het huisje ziet er recent uit, maar mist echter het periostracum; het heeft een herstelde breuk ongeveer in het midden (fig. 1).

Het lijkt vooralsnog niet aannemelijk dat deze *Caecum*-soort in Nederland levend voorkomt. Het meest noordelijke voorkomen is bekend uit Normandië, Frankrijk (Hoeksema & Hoenselaar, 1984). Aanvoer uit het zuiden (bijv. met riemwier) mag dan ook niet worden uitgesloten.

Aangezien er bij Cadzand veel fossielen aanspoelen, is het ook mogelijk dat we met een bijzonder gaaf fossiel exemplaar te maken hebben. *C. clarkii* is niet bekend uit het Noordzeebekken. De soort wordt niet genoemd in de lijst van Janssen (1975). Het betreft hier dus waarschijnlijk de eerste vondst in Nederland.

De determinatie werd bevestigd door de heren R. G. Moolenbeek en D. F. Hoeksema, waarvoor ik gaarne mijn dank betuig.

## LITERATUUR

- AARTSEN, J. J. VAN, & M. C. FEHR-DE WAL, 1975. A critical examination of *Caecum clarkii* Carpenter, 1858. – *Basteria* 39: 81-86.  
 HOEKSEMA, D. F., & H. J. HOENSELAAR, 1984. On the distribution of *Caecum clarkii* Carpenter, 1858 (Prosobranchia, Gastropoda) in the Channel. – *Basteria* 48: 27-30.  
 JANSSEN, A. W., 1975. Systematische lijst van Nederlandse recente en fossiele mollusken. – *Meded. Werkgr. Tert. Kwart. Geol.* 12: 115-170.




Fig. 1. *Caecum clarkii* Carpenter; Zeeland, Cadzand. Lengte 2,2 mm; doorsnede mondopening 0,45 mm; doorsnede bij septum 0,35 mm; lengte septumuitsteeksel (zie fig. 1a) 0,14 mm.